

DANIEL VLĂDUCU
MÁRTA KÁSA

MEMORATOR DE MATEMATICĂ

pentru clasele V-VIII

Ediția a VI-a

Editura Paralela 45

Redactare: Daniel Mitran
Tehnoredactare: Carmen Rădulescu
Pregătire de tipar: Marius Badea
Design copertă: Mirona Pintilie

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României

VLĂDUCU, DANIEL

Memorator de matematică pentru clasele V-VIII /

Daniel Vlăducu, Márta Kása. – Ed. a 6-a. – Pitești : Paralela 45, 2024

ISBN 978-973-47-4166-3

I. Kása, Márta

51

Copyright © Editura Paralela 45, 2024

Prezenta lucrare folosește denumiri ce constituie mărci înregistrate, iar conținutul este protejat de legislația privind dreptul de proprietate intelectuală.

Cuprins

ALGEBRĂ

MULȚIMEA NUMERELOR NATURALE (N)	5
• Operații cu numere naturale	5
MULȚIMI	7
• Relații între elemente și mulțimi	7
• Relații între mulțimi	8
• Operații cu mulțimi	8
DIVIZIBILITATEA NUMERELOR NATURALE	8
NUMERE RAȚIONALE	11
• Frația	11
• Operații cu fracții.....	13
• Frații zecimale	17
NUMERE IRAȚIONALE	17
• Operații cu radicali	18
MULȚIMEA NUMERELOR REALE (R)	18
• Mulțimi de numere, notații	18
ECUAȚII, INECUAȚII	19
• Ecuația de gradul I cu o necunoscută.....	19
• Inecuația de gradul I cu o necunoscută	19
• Sisteme de două ecuații de gradul I cu două necunoscute.....	20
• Ecuația de gradul al II-lea cu o necunoscută.....	20
UNITĂȚI DE MĂSURĂ	21
RAPOARTE ȘI PROPORȚII	22
• Raport	22
• Proporție	22
MULȚIMEA NUMERELOR ÎNTREGI (Z)	24
• Opusul unui număr întreg.....	24
• Modulul sau valoarea absolută.....	24
• Operații cu numere întregi.....	24
MEDII	26
CALCUL ALGEBRIC	27
• Monom (număr real reprezentat prin litere).....	27
FUNCȚII	29

GEOMETRIE

• Punctul	31
• Dreapta.....	31
• Puncte coliniare	31
• Segmentul de dreaptă	31
• Semidreapta	32
• Planul	32
• Spațiul geometric.....	32
UNGHIU	32
• Perpendicularare și oblice	35
PROIEȚII ORTOGONALE	35
TRIUNGHIU	36
• Linii importante într-un triunghi	37
• Clasificarea triunghiurilor după măsura unghiurilor.....	38
• Clasificarea triunghiurilor după lungimile laturilor	39
• Congruența și asemănarea triunghiurilor oarecare	40
• Relații metrice în triunghi	41
PATROLATERE	45
CERCUL	48
POLIGOANE	51
PUNCTE, DREPTE, PLANE	52
POLIEDRE	58
• Prisma	58
• Paralelipipedul.....	58
• Cubul	59
• Tetraedrul	59
• Piramida.....	60
• Trunchiul de piramidă	61
CORPURI ROTUNDE	62
• Cilindrul circular drept	62
• Conul circular drept.....	62
• Trunchiul de con circular drept	62
• Sfera.....	63

ALGEBRĂ



MULȚIMEA NUMERELOR NATURALE (N)

- Cifre romane (scrierea nepozițională):

I – 1

V – 5

X – 10

L – 50

C – 100

D – 500

M – 1000

- Cifre arabe (scrierea pozițională): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
- Numărul natural de două cifre \overline{ab} , unde $a \neq 0$, $\overline{ab} = 10a + b$.
- Număr natural de trei cifre \overline{abc} , unde $a \neq 0$, $\overline{abc} = 100a + 10b + c$.
- Numere consecutive – numerele care au diferența egală cu 1.
- Număr par – numărul care dă restul 0 la împărțirea cu 2 ($2n$ – număr par).
- Număr impar – numărul care dă restul 1 la împărțirea cu 2 ($2n + 1$ – număr impar).
- Mulțimea $\mathbf{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ se numește mulțimea numerelor naturale.

OPERAȚII CU NUMERE NATURALE

Adunarea

Oricare ar fi a, b , numere naturale, există c număr natural astfel încât: $a + b = c$, unde a, b – termeni; c – sumă.

Proprietăți:

1. Comutativitatea:

$a + b = b + a$, oricare ar fi a, b numere naturale

2. Asociativitatea:

$(a + b) + c = a + (b + c)$, oricare ar fi a, b, c numere naturale

3. Numărul 0 este element neutru față de adunare:

$a + 0 = 0 + a = a$, oricare ar fi a număr natural

Scăderea

Oricare ar fi a, b , numere naturale, $a \geq b$, există c număr natural astfel încât:

$$a - b = c, \text{ unde } a - \text{descăzut}; b - \text{scăzător}; c - \text{diferență.}$$

Înmulțirea

Oricare ar fi a, b , numere naturale, există c număr natural astfel încât: $a \cdot b = c$, unde a, b – factori; c – produs.

Proprietăți:

1. Comutativitatea:

$$a \cdot b = b \cdot a, \text{ oricare ar fi } a, b, \text{ numere naturale}$$

2. Asociativitatea:

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c), \text{ oricare ar fi } a, b, c \text{ numere naturale}$$

3. Distributivitatea:

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c; \quad a \cdot (b - c) = a \cdot b - a \cdot c, \text{ oricare ar fi } a, b, c \text{ numere naturale}$$

4. Numărul 1 este element neutru față de înmulțire:

$$a \cdot 1 = a, \text{ oricare ar fi } a \text{ număr natural}$$

Împărțirea

Fiind date două numere naturale d și $i, i \neq 0$, se poate scrie:

$$d : i = c + r : i, \text{ unde } 0 \leq r < i$$

Ordinea efectuării operațiilor

Dacă nu sunt paranteze, se efectuează în următoarea ordine:

- înmulțirea și împărțirea (operații de ordinul al doilea);
- adunarea și scăderea (operații de ordinul întâi).

Dacă sunt paranteze, se efectuează calculele:

- din parantezele rotunde (mici);
- din parantezele drepte (mari);
- din acolade.

Teorema împărțirii cu rest

Oricare ar fi două numere naturale d și $i, i \neq 0$, există două numere naturale c și $r, 0 \leq r < i$, astfel încât: $d = i \cdot c + r$.



RAPOARTE ȘI PROPORȚII

RAPORT

Definiție: Raportul a două mărimi a și b de aceeași natură, măsurate cu aceeași unitate de măsură este câtul a/b și reprezintă un număr.

PROPORȚIE

Definiție: Egalitatea a două rapoarte.

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}, \text{ unde } \left\{ \begin{array}{l} a, d - \text{extremi} \\ b, c - \text{mezi} \end{array} \right\} \text{ termenii proporției}$$

Proprietatea fundamentală a proporției: Produsul mezilor este egal cu produsul extremilor:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Rightarrow a \cdot d = b \cdot c$$

Observație: Dacă într-o proporție $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, $b = c$, avem $b^2 = a \cdot d$,

adică $b = \sqrt{a \cdot d}$, $a > 0$, $b > 0$ și b este media geometrică a numerelor a și d .

Proporții derivate

a) cu aceiași termeni:

- Dacă schimbăm mezii sau extremii între ei, se obține o nouă proporție:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \rightarrow \frac{d}{b} = \frac{c}{a} \rightarrow \frac{d}{c} = \frac{b}{a} \text{ etc.}$$

- Inversa unei proporții este tot o proporție.

b) cu termeni schimbați:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Rightarrow \frac{a \pm k \cdot b}{b} = \frac{c \pm k \cdot d}{d}; \frac{a}{a \pm k \cdot b} = \frac{c}{c \pm k \cdot d}, k \neq 0;$$

$$\frac{a \pm k \cdot c}{b \pm k \cdot d} = \frac{a}{b} = \frac{c}{d}; \frac{a + k \cdot b}{a - k \cdot b} = \frac{c + k \cdot d}{c - k \cdot d}, k \neq 0.$$

Șir de rapoarte egale (indiferent de numărul rapoartelor)

$$\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \frac{a_3}{b_3} = \frac{a_1 + a_2 + a_3}{b_1 + b_2 + b_3}.$$

Aflarea unui termen necunoscut al unei proporții

$$\frac{x}{b} = \frac{c}{d} \Rightarrow x = \frac{b \cdot c}{d}; \quad \frac{a}{x} = \frac{c}{d} \Rightarrow x = \frac{a \cdot d}{c};$$

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{x} \Rightarrow x = \frac{b \cdot c}{a}; \quad \frac{a}{b} = \frac{x}{d} \Rightarrow x = \frac{a \cdot d}{b}.$$

un extrem = $\frac{\text{produsul mezilor}}{\text{celălalt extrem}}$; un mez = $\frac{\text{produsul extremilor}}{\text{celălalt mez}}$.

Proporționalitatea directă

$\{a, b, c, d, \dots, z\}$ și $\{a', b', c', d', \dots, z'\}$ sunt direct proporționale

dacă $\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'} = \frac{d}{d'} = \dots = \frac{z}{z'} = p$, unde p = coeficient de proporționalitate.

Proporționalitatea inversă

$\{a, b, c, d, \dots, z\}$ și $\{a', b', c', d', \dots, z'\}$ sunt invers proporționale dacă $a \cdot a' = b \cdot b' = c \cdot c' = \dots = z \cdot z'$.

Regula de trei simplă

Dacă a b
 c $x = ?$

- pentru mărimi direct proporționale rezultă: $\frac{a}{c} = \frac{b}{x} \Rightarrow x = \frac{b \cdot c}{a}$;
- pentru mărimi invers proporționale rezultă: $c \cdot x = a \cdot b$; $x = \frac{a \cdot b}{c}$.

Regula de trei compusă

Se aplică atunci când în probleme intervin 3 sau mai multe mulțimi (fiecare având câte 2 elemente cunoscute, iar o mulțime cu un element cunoscut și unul necunoscut). Determinarea necunoscutei se face aplicând succesiv „regula de trei simplă”.

GEOMETRIE

PUNCTUL

Definiție: Figura geometrică elementară, fără nicio dimensiune.

Puncte distincte: Fie $A, B: A \neq B$.

Puncte confundate: Fie $A, B: A = B$.

DREAPTA

Definiție: Drumul cel mai scurt, în spațiu, dintre două puncte distincte între ele, prelungit în ambele sensuri oricât de mult.

Proprietăți: Dreapta are lungime infinită.



PUNCTE COLINIARE

Definiție: Trei sau mai multe puncte care aparțin aceleiași drepte.

SEGMENTUL DE DREAPTĂ

Definiție: Porțiunea dintr-o dreaptă d , cuprinsă între două puncte A și B .

Notății: (AB) segment deschis (nu conține punctele A și B)

$[AB]$ segment închis (conține și punctele A și B)

$[AB)$ segment semideschis (îl conține pe A , dar nu și pe B)



• Două segmente care au aceeași lungime se numesc segmente congruente.

Exemplu: $AB = 5,3$ cm și $CD = 5,3$ cm $\Rightarrow AB$ și CD sunt congruente. Notăm $[AB] \equiv [CD]$.

• Un punct M este mijlocul unui segment $[AB]$ dacă M este situat între A și B , iar $[AM] \equiv [MB]$.

SEMIDREAPTA


Orice punct al unei drepte determină pe dreapta respectivă două semidrepte opuse.

PLANUL

Definiție: Figura geometrică formată din toate dreptele care trec printr-un punct M dat (care nu aparține unei drepte d) și un punct P , care parcurge dreapta d în întregime.

Proprietăți:

1. Trei puncte distincte determină un plan.
2. Două drepte concurente sau paralele determină un plan.
3. O dreaptă și un punct care nu-i aparține determină un plan.



SPAȚIUL GEOMETRIC

Definiție: Suprafața care conține toate planele paralele și neparalele cu un plan dat.



UNGHIUL

Definiție: Figura geometrică formată din două semidrepte (d_1 și d_2) care au aceeași origine O .


Laturile unghiului – cele două semidrepte.

Vârful unghiului – originea comună a celor două semidrepte.

Măsura unghiului: se face prin măsurarea deschiderii dintre semidreptele care formează unghiul. Ea se determină cu ajutorul arcelor de cerc, socotind că un semicerc are 180° . Deci, unitatea de măsură este unghiul de 1° .


Două unghiuri care au aceeași măsură se numesc unghiuri congruente. Notăm $\sphericalangle ABC \equiv \sphericalangle DEF$ sau $m(\sphericalangle ABC) = m(\sphericalangle DEF)$.

Unghiul alungit (180°)




Format din două semidrepte opuse.

Unghiul nul (0°)




Unghiul ale cărui laturi se confundă.

Unghiul drept (90°)




Laturile unghiului sunt perpendiculare.


Unghiul ascuțit ($< 90^\circ$)



Unghiul obtuz ($> 90^\circ$)




Unghiul în jurul unui punct ($= 360^\circ$)




Unghiuri complementare

$$m(\sphericalangle AOB) + m(\sphericalangle A'O'B') = 90^\circ$$




Unghiuri suplementare

$$m(\sphericalangle AOB) + m(\sphericalangle A'O'B') = 180^\circ$$



Unghiuri adiacente


Definiție: Două unghiuri care au o latură comună, iar celelalte două laturi situate de o parte și de alta a acesteia.



Unghiuri opuse la vârf


Definiție: Unghiuri formate de două drepte care se intersectează.

$$\sphericalangle AOB \cong \sphericalangle A'O'B'$$



Bisectoarea unui unghi

Definiție: Semidreapta cu originea în vârful unghiului care împarte un unghi în două părți egale. Bisectoarea este locul geometric al punctelor egal depărtate de laturi.



- Bisectoarele a două unghiuri opuse la vârf sunt semidrepte opuse.
- Bisectoarele a două unghiuri adiacente suplementare formează un unghi drept.


Unghiuri cu laturile paralele

$$OB \parallel O'B'$$

$$OA \parallel O'A'$$

$$\sphericalangle AOB \equiv \sphericalangle A'O'B' \text{ (egale)}$$

$$\sphericalangle AOC + \sphericalangle A'O'B' = 180^\circ \text{ (suplementare)}$$




Unghiuri exterioare unui triunghi

$$\sphericalangle 4 = \sphericalangle 1 + \sphericalangle 2$$

$$\sphericalangle 5 = \sphericalangle 1 + \sphericalangle 3$$

$$\sphericalangle 6 = \sphericalangle 3 + \sphericalangle 2$$


Măsura unghiului exterior unui triunghi este egală cu suma măsurilor unghiurilor neadiacente lui.



Unghiuri într-un patrulater

$$\sphericalangle A + \sphericalangle B + \sphericalangle C + \sphericalangle D = 360^\circ$$


Suma măsurilor unghiurilor unui patrulater convex este de 360° .



Unghiuri într-un poligon convex cu n laturi

$$\sphericalangle 1 + \sphericalangle 2 + \sphericalangle 3 + \dots + \sphericalangle n = (n - 2) \cdot 180^\circ$$

Suma măsurilor tuturor unghiurilor dintr-un poligon convex cu n laturi este $(n - 2) \cdot 180^\circ$.



Drepte paralele

Definiție: Două drepte distincte și coplanare sunt paralele dacă nu au niciun punct comun. (**Notație:** $a \parallel b$ sau $AB \parallel CD$.)

O secantă și două drepte paralele ($a \parallel b$) formează:

• Unghiuri alterne interne congruente

$$\sphericalangle 3 \equiv \sphericalangle 5; \sphericalangle 4 \equiv \sphericalangle 6.$$

• Unghiuri alterne externe congruente

$$\sphericalangle 1 \equiv \sphericalangle 7; \sphericalangle 2 \equiv \sphericalangle 8.$$

• Unghiuri corespondente congruente


$$\sphericalangle 1 \equiv \sphericalangle 5; \sphericalangle 2 \equiv \sphericalangle 6; \sphericalangle 3 \equiv \sphericalangle 7; \sphericalangle 4 \equiv \sphericalangle 8.$$

• Unghiuri interne de aceeași parte a secantei suplementare

$$\sphericalangle 4 + \sphericalangle 5 = 180^\circ; \sphericalangle 3 + \sphericalangle 6 = 180^\circ.$$


• Unghiuri externe de aceeași parte a secantei suplementare

$$\sphericalangle 1 + \sphericalangle 8 = 180^\circ; \sphericalangle 2 + \sphericalangle 7 = 180^\circ.$$



Paralelele echidistante determină pe o secantă segmente egale.

$$a = b = c = d$$



PERPENDICULARE ȘI OBLICE

Definiție: Vom numi **perpendiculară** pe o dreaptă dată d orice dreaptă d' , concurentă cu d , care face cu aceasta un unghi cu măsura de 90° .

Notăție: $d \perp d'$

Distanța de la un punct la o dreaptă este **perpendiculara** din punct pe acea dreaptă.

Definiție: Vom numi **oblică** față de d orice dreaptă d' , concurentă cu dreapta d , care face cu aceasta un unghi propriu diferit de 90° .



PROIECȚII ORTOGONALE

Proiecția unui punct A pe dreapta d este piciorul perpendicularei duse din A la d .

